

NIEUWSBRIEF SCHAPEN

In deze nieuwsbrief:

Mededelingen vanuit de
praktijk

[Pagina 1](#)

Drachtcontrole

[Pagina 2](#)

Stijve overhouders

[Pagina 2](#)

Casus uit de praktijk

[Pagina 3](#)

Uw mening telt!

[Pagina 3](#)



DEKSEIZOEN

In deze periode loopt bij velen de dekram weer bij het koppel. Als u te maken heeft met veel terugkomers, neem dan contact op met uw dierenarts voor nader onderzoek. De problemen kunnen zowel afkomstig zijn van de oaien als van de dekram. Vermijd in de dekperiode en daarna te nauw contact tussen schaap en rund. Zo voorkomt u dat ziekten overgaan van rund op schaap of omgekeerd.

MEDEDELINGEN VANUIT DE PRAKTIJK

- We zien onderweg veel resistentie voor ontwormingsmiddelen uit Groep 3 (Ivomec/Dectomax/Cydectin/Noromectine/Eprinex-multi). Houd hier rekening mee en laat de mest 2 weken na ontwormen controleren.
- Wij willen u vragen de visites tussen 8.00 uur en 9.00 uur door te bellen. Na 9.00 uur worden er extra kosten in rekening gebracht.

Drachtcontrole


Drachtigheidsonderzoek bij schapen vindt plaats door middel van **scannen**. Er kunnen verschillende redenen zijn om een koppel ooien te scannen:

- Guste ooien opruimen
- Tellen hoeveel lammeren er in zitten om de voeding aan te kunnen passen
- Drachtlengte inschatten voor een betere planning

Drachtigheid is met behulp van echografie het meest nauwkeurig vast te stellen op een drachtlengte van **30 tot 70 dagen**. Wanneer men het aantal lammeren wil weten, is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te scannen, tot om en nabij **40 dagen**.

Drachten **langer dan 70 dagen** kunnen zeker gediagnosticeerd worden, maar het aantal vruchtjes is moeilijk te tellen, omdat de lammeren zo groot worden dat ze niet meer compleet op het scanbeeld passen. Het scannen vindt plaats bij het staande schaap. Het is een inwendig onderzoek waarbij de scanner rectaal wordt ingebracht. Het is een snelle en zekere methode.

Ter voorbereiding van het scannen heeft het de voorkeur de schapen op te stallen.



1: kop
2: oog
3: rozen van de baarmoeder

4. hart
5. ribben
6. navelstreng
7. maag

Stijve overhouders

Het is belangrijk om de drachtige oilammeren in de winter bij te voeren, ook als er voldoende gras staat. Gebeurt dit niet, dan kunnen er bewegingsstoornissen optreden. Het skelet van jonge ooien is namelijk nog niet volledig ontwikkeld. Aan het eind van de dracht vraagt ook de ontwikkeling van de lammeren in de baarmoeder de nodige energie. Als rond die tijd het aanbod van **calcium, fosfor en/of vitamine D** onvoldoende is, ontstaan botstoffelingsproblemen.

In dat geval zie je dat de oilammeren stijf gaan lopen, vandaar de term stijve overhouders. Even later gaan ze kreupel lopen. Als ze niet behandeld worden, krijgen ze verdikkingen aan de uiteinden van de lange beenderen.

Zorg daarom dat de dieren altijd hooi en brok bijgevoerd krijgen zodat er geen vitamine D tekort ontstaat. De dieren die worden behandeld op het moment dat er al klachten zijn, reageren beduidend minder snel. Tevens kunnen er bij deze dieren ook geboorteproblemen ontstaan, omdat botverdikkingen op de bekkenbodem een vernauwing van de geboorteweg kunnen veroorzaken.

Voorkomen is beter dan genezen!

Casus uit de praktijk: fotosensibiliteit

De eerste gevallen van fotosensibiliteit bij schapen dit jaar zijn weer een feit. Symptomen waarop u alert moet zijn:

- Onverklaarbare dikke koppen
- Huidafwijkingen rond de ogen of oren
- Ernstige jeuk aan de kop
- Gele slijmvliezen

Fotosensibiliteit is een overgevoeligheid voor zonlicht veroorzaakt door een stof (fytoporfirine) die via de bloedbaan in de huid terecht komt. Deze stof wordt in de pens aangemaakt door de omzetting van bladgroen. Onder invloed van zonlicht leidt dit tot beschadiging van de huid. Normaal gesproken wordt deze stof met de gal uitgescheiden, dit gebeurt echter niet als de lever beschadigd is. Vaak komt dat door bepaalde planten en schimmels die deze leverschade veroorzaken. Dit is waarom het nodig kan zijn grasmonsters op te sturen voor onderzoek op schimmels. Met bloedonderzoek kan een eventuele leverbeschadiging worden aangetoond. Bij symptomen, contacteer meteen uw dierenarts. We kunnen een snelle behandeling instellen waardoor de kans op genezing groter is.



Uw mening telt!

Om de kwaliteit van onze service te kunnen verbeteren willen we graag zo nu en dan uw mening over bepaalde onderwerpen peilen. Daarom vindt u vanaf nu in deze nieuwsbrief een poll-knop, waarbij verscheidene onderwerpen de revue zullen gaan passeren.



Als eerste willen wij graag van u weten:

Hoe informatief vindt u de nieuwsbrief van De Herkauwerspraktijk?

Weinig informatief



Zeer informatief